



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU LOT

PREFECTURE DU LOT

CABINET DU PREFET

Affaire suivie par : Yann LE ROY  
Adjoint au Directeur de Cabinet  
Tél : 05 65 23 10 70  
Fax : 05 65 22 69 36  
yann.le-roy@lot.gouv.fr

LE PRÉFET DU LOT

à

MESDAMES ET MESSIEURS LES MAIRES DU  
DÉPARTEMENT

avec communication aux sous-préfets de Figeac et de  
Gourdon

Cahors, le 17 octobre 2014

**Objet** : recommandations relatives à la conduite à tenir au regard du risque EBOLA.

**P.J.** : 2 fiches

Comme vous le savez, l'épidémie de maladie virale EBOLA touche actuellement un grand nombre des pays d'Afrique de l'Ouest.

Dernièrement, des cas isolés de personnes touchées par ce virus ont été détectées hors d'Afrique ; cependant, le territoire national n'est pas en situation d'épidémie ; la situation sanitaire est maîtrisée et ne nécessite pas, pour le moment, d'activation de dispositif de gestion de crise.

Il m'a paru cependant utile de vous apporter quelques éléments d'information sur cette maladie, afin de rassurer et d'informer toute personne qui vous solliciterait à ce sujet.

1) la durée d'incubation, qui correspond à la période entre l'infection de la personne et l'apparition des premiers symptômes, varie entre 2 à 21 jours (moyenne de 8 jours) ;

2) les symptômes sont reconnaissables : dans la forme habituelle, la maladie débute brutalement par l'apparition d'une fièvre élevée (supérieure ou égale à 38 °), de douleurs articulaires et/ou musculaires, de maux de tête, ainsi que d'une fatigue générale. En 3 à 4 jours, apparaissent d'autres symptômes au niveau de la peau et des muqueuses (conjonctivite, éruption cutanée, difficulté à avaler) et digestifs (diarrhée, vomissements). La phase terminale est marquée par des signes neurologiques (de l'obnubilation au coma, agitation...) et des hémorragies extériorisées (saignements de nez et des gencives, toux et selles sanglantes...)

3) la transmission du virus s'effectue d'homme à homme par :

- contact direct avec le sang ou les fluides biologiques tels les larmes, la salive, le lait maternel, le sperme, la sueur, les selles et les vomissements des personnes infectées ;
- exposition directe à des objets (comme des aiguilles souillées) qui ont été contaminés par les sécrétions des patients.

La transmission par voie aérienne n'a jamais été avérée lors d'une épidémie chez l'homme. Il n'y a pas de transmission lors de la période d'incubation. **Une personne qui ne présente aucun symptôme n'est donc pas contagieuse.**

Le début de la contagiosité est lié à l'apparition des premiers symptômes. Plus la maladie évolue dans le temps, plus le patient est contagieux, notamment en phase terminale. Le virus peut aussi se transmettre au contact du corps d'une personne décédée infectée.

Telles sont les informations que j'ai souhaité vous communiquer sur cette maladie, qui sont complétées par deux fiches explicatives ci-jointes

Le Préfet,



Jean-Pierre CAZENAVE-LACROUTS